

SEROTONINA PLAQUETARIA

Durante 15 días antes de la toma de muestra, el paciente debe suspender (si el médico lo consiente), toda medicación con inhibidores de la MAO (antidepresivos). En caso contrario deberá informar la medicación que recibe.

Durante los 2 días anteriores a la extracción de sangre deberá **abstenerse de ingerir**: nueces, ananás, berenjenas, maníes, bananas.

APELLIDO:..... NOMBRE:

Nº DE PROTOCOLO:

MEDICACIÓN:

MOTIVO DEL ANALISIS O DIAGNOSTICO:

.....

DATOS A COMPLETAR POR EL LABORATORIO

VOLUMEN TOTAL DE SANGRE CENTRIFUGADO:ml

RECUENTO DE PLAQUETAS EN SANGRE...../mm³

RECUENTO DE PLAQUETAS EN PLASMA RICO (PRP)...../mm³

VOL DE PRP CENTRIFUGADO EN CADA VIAL:ml

OBERVACIONES:

Responsable de preparación:



Quedamos a disposición de cualquier consulta o sugerencia.



Urquiza 934 | Telefax [03446] 424777
indabi@indabi.com.ar | www.indabi.com.ar
WhatsApp: 3446500591 | Gualaguaychú