

TEST DE AIRE EXPIRADO PARA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI

(Método no invasivo, con urea marcada con ^{13}C , isótopo estable no radiactivo.)

- Concurrir al laboratorio, con 6 horas de ayuno, como mínimo y sin fumar.
- Si usted está sometido a un tratamiento con antiácidos, especialmente: inhibidores de la bomba de protones o con sales de bismuto, dejar transcurrir 2 semanas libres de medicación antes de realizar el test diagnóstico.
- En el caso de haber sido tratado con antibióticos deberán transcurrir 10 días sin tratamiento antes de realizar el test.

Nota: Si el propósito es confirmar o monitorear el tratamiento para erradicar el H. pylori, debe transcurrir un mes como mínimo de finalizado el mismo antes de realizar esta prueba.

Estamos a su disposición, ante cualquier inquietud consúltenos.

*IP-ADM-61. TEST DE AIRE EXPIRADO PARA DETECCIÓN DE HELICOBACTER
PYLORI*

Rev.0 Julio 2016

Aprobó Roberto Piaggio



IRAM ISO 9001-2008
CERTIFICADO EN GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS PREANALÍTICOS ANALÍTICOS Y POST ANALÍTICOS



Urquiza 934 | Telefax [03446] 424777
E2820ABF | Gualguaychú | Entre Ríos
indabi@indabi.com.ar | www.indabi.com.ar